

KONTRAINDIKACE

KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Seznam chorob/stavů

Poporodní období. Kojení < 6 týdnů po porodu. Kojení > 6 týdnů < 6 měsíců po porodu. Šestinedělí nekojící ženy < 21 dní.

Kardiovaskulární rizika - arteriální morbidita a hypertenze. Kouření věk > 35 let > 15 cigaret/den. Rizikové faktory pro intraarteriální trombózu (věk, kouření, diabetes mellitus, hypertenze). Adekvátně léčená a kontrolovaná hypertenze, kde TK může být sledován. TK 140-159/90-99. Systola > 160 nebo diastola > 100. Hypertenze s cévními změnami. Aktuální nebo anamnestická ICHS. Anamnestická centrální mozková příhoda. Srdeční chlopenní vady komplikované. Migréna s aurou. Migréna bez aury > 35 let - zahájení. Migréna bez aury > 35 let - pokračování. Antifosfolipidový syndrom s pozitivitou, nebo neznámým statutem antifosfolipidových protilátek.

Kardiovaskulární rizika - venózní morbidita. Anamnéza TEN. Aktuální TEN. Velká operace s prolongovanou imobilizací. Známé trombofilní mutace (mutace genu pro faktor V - leidská, deficit proteinu S, C, AT III, mutace genu pro protrombin).

Karcinom prsu. Aktuální karcinom prsu. Anamnestický karcinom prsu remise > 5 let.

Diabetes mellitus. Diabetes mellitus s nefropatií, retinopatií, neuropatií - zahájení. Diabetes mellitus s nefropatií, retinopatií, neuropatií - pokračování.

Onemocnění jater. Virová hepatitis aktivní. Cirhóza dekompenzovaná. Adenom jater benigní. Maligní hepatom. Cirhóza kompenzovaná. Cholestatická hepatóza pro COCs. Cholelitiáza symptomatická aktuální. Cholelitiáza symptomatická léčená farmakoterapií.

Léky. Rifampicin. Antikonvulziva (fenytoin, karbamazepin, barbituráty, oxkarbazepin).